TYPE OF INDUSTRY

科学技術・大学

排水処理技術の開発促進

アンモニアを無酸素で活性

東工大など人工触媒発見

東京工業大学の中村龍平教授らは、酸素分子を使わずにアンモニアを活性化する人工触媒を発見した。37種類の鉱物材料の触媒活性を調査。アンモニアと亜硝酸から窒素ガスを作り出す「アナモックス反応」について、硫化銅が特異的に触媒作用を示すことが分かった。アンモニアを活性化する新たな反応経路を見いだしたことで、排水処理技術の開発やアミノ酸や核酸塩基などが重要な役割を担う生命起源の研究の促進につながる。

理化学研究所との共同研究。成果は英ネイチャー姉妹誌に掲載された。

37種類の金属系の硫化物や酸化物、水酸化物の触媒活性をガスクロマトグラフィー質量分析計で分析。硫化銅だけがアンモニアの生成に活性を示した。アナモックス反応の触媒活性を示した硫化銅をX線回折とラマン分析で調べると、天然に存在する2価の銅イオンを含む硫化銅鉱物「コベライト鉱物」と同じ構造であることが明らかになった。

硫化銅を使うことでアナモックス反応の途中で生成する反応性が高く不安定なヒドラジンを作れるか検証したところ、中間体として検出でき窒素分子に酸化することを確認できた。

アナモックス反応は1995年に排水処理場に生息する細菌で発見された。地球海洋における固定窒素の50％近くの除去に関与する重要な反応で、世界中で30年近く研究されてきた。だが、アナモックス反応を駆動できる人工触媒は見つかっていなかった。

現在は、脳局所への光照射には外科的処置が必要だが、近赤外光活性化ナノ粒子などの新しい光伝送方法が使えればヒトへの応用が進むと期待される。

睡眠を人為的に誘導

光感受性薬物、筑波大が開発

筑波大学のミハエル・ラザルス教授と斉藤毅准教授らは、睡眠を人為的に誘導する光感受性薬物の開発に成功した。光照射により、睡眠調節に重要なアデノシンA2A受容体（A2AR）の感受性を高めることで睡眠状態に導く。不眠症治療薬のほか、他の受容体を標的とする脳機能調節薬開発にもつながる可能性がある。

研究グループは、脳の側坐核に存在するグリア細胞とニューロンの活動によりアデノシン濃度が局所的に変化し、A2ARの活性化を介して睡眠を制御していることを発見。

ただ、A2ARは他の器官にも存在し、遺伝子改変なしに脳内のA2ARのみ選択的に機能調節することは難しい。そこで、光で活性を制御する技術に着目し、側坐核に発現するA2ARのアデノシン活性を増強する光応答性薬物を開発した。

これをマウスに腹腔内投与し、脳に埋め込んだ光ファイバーを介して側坐核に可視光を照射すると、マウスの睡眠時間を約1・7倍に増加できた。A2AR欠損マウスや側坐核以外の脳領域への光照射では効果は見られなかった。

中核人材育成セミナノ材料分析方法実習など

東洋大が来月

東洋大学は6月21日9時半から同大川越キャンパス（埼玉県川越市）バイオナノエレクトロニクス研究センター1β棟で2024年度第1回「中核人材育成セミナー」を開催する。同大理工学部の根岸良太教授が講師となり、臨床現場即時検査（POCT）への応用に向けたナノカーボンの合成、バイオセンサー応用についての紹介やナノ材料の分析方法について実習する。

企業や自治体が対象。定員は12人で参加無料。申込期限は6月7日。申し込みは（https://forms.gle/FYVFkUWZ1vU8KHpr7）から。問い合わせは東洋大学産学協同教育センター（tpec@toyo.jp）へ。

情報フラッシュ

◆法曹コース設置　専修大学　法学部に法曹コースを設置した。同コースで定められた要件を満たした学生は3年次終了時に大学を早期卒業して法科大学院に進学できる。法学部と法科大学院でより効果的な一貫教育の提供を目指す。大学入学から法曹資格を得るまでの最短期間が従来の8年弱から約6年に短縮されることによって経済的な負担が減り、裁判官、検察官、弁護士などを目指しやすくなる。

赤穂市
赤穂市
赤穂市